



**UNIFESO - Centro Universitário Serra dos Órgãos**  
**CCS – Centro de Ciências da Saúde**

# Teste de Progresso 2009

## ODONTOLOGIA

Prezado Aluno

Você está realizando o Teste de Progresso. Este não objetiva aprovar, selecionar ou classificar: procura dimensionar o seu ganho de conhecimento cognitivo e constatar sua evolução individual no processo de construção de sua aprendizagem. Por isso, ao participar do teste está fazendo o acompanhamento de seu crescimento ao longo do curso.

Dependendo do período em que se encontra, muitas destas questões poderão ser desconhecidas. Mesmo assim, esforce-se para respondê-las.

O resultado do teste será entregue individualmente, aos alunos que participaram.

Boa sorte!

Comissão de Avaliação


---

### **INSTRUÇÕES:**

---

- Assine o cartão de respostas com caneta azul ou preta conforme assinatura no documento de identidade apresentado.
- Marque o cartão de respostas preenchendo **TODO O ESPAÇO** sobre a letra correta (■) em tinta azul ou preta.
- **NÃO** serão permitidas rasuras no cartão de respostas. As questões rasuradas serão consideradas erradas.
- Somente entregue o cartão de respostas. O caderno de questões poderá ser levado para a conferência do gabarito, desde que tenha decorrido uma hora do início da prova.
- **NÃO** é permitido manter telefone celular, ou quaisquer dispositivos eletrônicos ligados na sala de prova.
- Fica proibido qualquer tipo de consulta.
- Os professores responsáveis pela aplicação do teste **NÃO** poderão esclarecer dúvidas. O entendimento dos enunciados faz parte da avaliação.
- A prova contém 80 (oitenta) questões numeradas, de múltipla escolha, com cinco opções cada, onde há somente única resposta correta.
- A duração da prova é de três horas improrrogáveis, incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas. Ao final deste tempo, os cartões serão recolhidos.
- Os três últimos candidatos sairão da sala de prova em conjunto.
- O aluno somente poderá retirar-se da sala, após decorrida a primeira hora partir do início do teste.

1. Apesar do progresso verificado nos últimos anos, o Brasil continua sendo um país em que há uma grande desigualdade de renda entre os cidadãos. Uma forma de se constatar este fato é por meio da Curva de Lorenz, que fornece, para cada valor de  $x$  entre 0 e 100, o percentual da renda total do País auferido pelos  $x\%$  de brasileiros de menor renda. Por exemplo, na Curva de Lorenz para 2004, apresentada ao lado, constata-se que a renda total dos 60% de menor renda representou apenas 20% da renda total. De acordo com o mesmo gráfico, o percentual da renda total correspondente aos 20% de maior renda foi, aproximadamente, igual a:



Disponível em: [http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/desigualdaderendanobrasil/cap\\_04\\_avaliandoasignificancia.pdf](http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/desigualdaderendanobrasil/cap_04_avaliandoasignificancia.pdf)

- (A) 20%
- (B) 40%
- (C) 50%
- (D) 60%**
- (E) 80%

2. A França vem enfrentando problemas sociais internos que repercutem na imagem do País no exterior. Ainda que não interfiram diretamente nas relações internacionais francesas, episódios de violência ocorridos na periferia de Paris colocam o País em evidência. Esses episódios de conflitos violentos estão fortemente vinculados aos protestos e reivindicações do segmento social dos(as)

- (A) tribos urbanas neonazistas.
- (B) refugiados Políticos.
- (C) ex-combatentes de guerra.
- (D) fundamentalistas religiosos.
- (E) imigrantes e trabalhadores.**

3. A foto a seguir, da americana Margaret Bourke-White (1904-71), apresenta desempregados na fila de alimentos durante a Grande Depressão, que se iniciou em 1929.



Além da preocupação com a perfeita composição, a artista, nessa foto, revela

- (A) a capacidade de organização do operariado.
- (B) a esperança de um futuro melhor para negros.
- (C) a possibilidade de ascensão social universal.
- (D) as contradições da sociedade capitalista.**
- (E) o consumismo de determinadas classes sociais.

4. Foi há poucas décadas que o mundo acordou para as questões globais do meio ambiente. Demorou bastante, desde que começou a Revolução Industrial, para que se entendesse que o progresso a qualquer custo deveria ser questionado. Afinal, não é mais possível garantir moradia, bens e alimentos de uma crescente população mundial à custa da derrubada indiscriminada das florestas e do aumento da poluição do ar. Sabe-se, hoje, que o meio ambiente global não conhece fronteiras, sendo um sistema complexo e dinâmico. Na tentativa de encaminhar soluções para os graves problemas ambientais que afetam a todos, passaram a ser negociados políticas e acordos internacionais, dos quais um dos mais importantes é o Protocolo de Kyoto.

Com o auxílio do texto e considerando a magnitude da questão ambiental no mundo contemporâneo, assinale a opção incorreta.

- (A) Um título adequado ao texto seria: Todo progresso é bem-vindo.**
- (B) Em tese, o texto confirma a seguinte proposição: a poluição do ar na Inglaterra pode ocasionar uma chuva ácida na Noruega.
- (C) Um dos mais graves problemas apontados pelos especialistas, na atualidade, diz respeito à água, elemento indispensável à vida e em processo de escassez.
- (D) O modelo tradicional de industrialização começa a ser combatido devido ao seu poder de destruição do meio ambiente.
- (E) emissão descontrolada de gases poluentes amplia o efeito estufa, de que decorre o denominado aquecimento global.

5. A exposição aos raios ultravioleta tipo B (UVB) causa queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões graves ao longo do tempo. Por essa razão, recomenda-se a utilização de filtros solares, que deixam passar apenas uma certa fração desses raios, indicada pelo Fator de Proteção Solar (FPS). Por exemplo, um protetor com FPS igual a 10 deixa passar apenas 1/10 (ou seja, retém 90%) dos raios UVB. Um protetor que retenha 95% dos raios UVB possui um FPS igual a:

- (A) 95
- (B) 90
- (C) 50
- (D) 20**
- (E) 5

6. Globalização é o nome que comumente se dá ao atual estágio da economia mundial. Novas e incessantes inovações tecnológicas ampliam a produção e estimulam a notável expansão do comércio em escala planetária. Afora esses aspectos considerados positivos, muito do que os defensores da globalização defendiam não se concretizou, pelo menos até hoje. O certo é que as reformas liberalizantes, a exemplo da abertura dos mercados, das privatizações das empresas públicas e da redução dos direitos trabalhistas, não trouxeram o desenvolvimento alardeado nem melhoraram a distribuição de renda. Aliás, em alguns países aconteceu o contrário.

- (A) Deduz-se do texto que nem tudo que chegou a ser sonhado por alguns com a globalização conseguiu concretizar-se.
- (B) O conhecimento científico-tecnológico desempenha importante papel na economia globalizada de hoje.
- (C) Na atualidade, o baixo nível educacional da maioria da população mundial impede o aumento da produção e, com isso, reduz o volume de comércio entre os países.**
- (D) Segundo o texto, em alguns países, os efeitos da globalização foram bastante negativos, concentrando a renda e não trazendo o progresso.
- (E) O Brasil foi um dos países que mais se empenharam em promover o que o texto chama de "reformas liberalizantes".

#### 7. CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE?

As melhores leis a favor das mulheres de cada país-membro da União Européia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção à equidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação que assegure a inclusão social das cidadãs deve contemplar outros temas, além dos citados.

São dois os temas mais específicos para essa legislação:

- (A) cotas raciais e assédio moral.
- (B) aborto e violência doméstica.**
- (C) educação moral e trabalho.
- (D) estupro e imigração clandestina.
- (E) liberdade de expressão e divórcio.

8. A política brasileira nas áreas rurais é caracterizada por enfrentamentos que se expressam, dentre outros, por organizações da sociedade civil, em associações, sindicatos, movimentos sociais, etc. O par de entidades da sociedade civil que representam distintas classes sociais e interesses conflitantes quanto a questão da terra é:

- (A) Liga Camponesa/Via Campesina.
- (B) Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/Via Campesina.
- (C) União Democrática Ruralista/ Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.**
- (D) União Democrática Ruralista/ Sindicato dos Proprietários Rurais.
- (E) Movimentos dos Atingidos por Barragens/ Liga Camponesa.

#### 9. Observe a figura abaixo:



Millôr Fernandes. Veja, São Paulo.

A charge de Millôr apresentada aponta para

- (A) a persuasão como estratégia de convencimento.
- (B) a defesa das convicções políticas.
- (C) a fragilidade dos princípios morais.**
- (D) o predomínio do econômico sobre o ético.
- (E) o desrespeito às relações profissionais.

#### 10. A charge de Millôr trata de uma questão importante quando falamos de ética.

Assinale a alternativa que melhor retrata o sentido da charge:

- (A) total desrespeito às questões religiosas e éticas.
- (B) defesa das convicções morais frente à corrupção.
- (C) ênfase no êxito econômico acima de qualquer coisa.
- (D) perda da fé e da esperança num mundo globalizado.
- (E) perda dos valores éticos nos tempos modernos.**

11. O fator etiológico principal da gengivite e da doença periodontal é:

- (A) o cálculo dental
- (B) placa dental**
- (C) película adquirida
- (D) restauração defeituosa
- (E) matéria Alba

12. Entre as neoplasias abaixo, indique aquela que representa o principal câncer bucal:

- (A) Adenoma pleomórfico
- (B) Lipoma
- (C) Fibroma
- (D) Osteossarcoma
- (E) Carcinoma epidermóide**

13. O leucoedema é uma alteração de normalidade que ocorre:

- (A) Na língua
- (B) No palato
- (C) No assoalho bucal
- (D) Na Mucosa jugal**
- (E) Nos lábios

14. A candidose eritematosa é uma lesão vermelha comumente encontrada na cavidade bucal, sobre ela é correto afirmar que:

- (A) A lesão elementar da doença é uma vesícula
- (B) A atrofia epitelial justifica a sua cor vermelha**
- (C) Clinicamente manifesta-se como placa
- (D) O agente etiológico é uma bactéria
- (E) O tratamento da doença é realizado com bacteriostáticos

15. Entre as alterações teciduais que ocorrem na pulpíte reversível podemos citar:

- (A) Hiperemia**
- (B) Necrose de liquefação
- (C) Necrose de coagulação
- (D) Necrose caseosa
- (E) Calcificação distrófica

16. Sobre a displasia severa epitelial podemos afirmar que:

- (A) São alterações celulares que ocorrem somente na camada basal do tecido epitelial
- (B) São alterações celulares que ocorrem somente nos melanócitos do tecido epitelial
- (C) São alterações celulares encontradas nas eritroplasias bucais**
- (D) São alterações celulares encontradas apenas na camada espinhosa do epitélio
- (E) São alterações celulares encontradas nos fibroblastos

17. A hemofilia B é caracterizada pela deficiência do fator:

- (A) VII
- (B) XII
- (C) X
- (D) VIII
- (E) IX**

18. Entre os tumores abaixo indique aquele que possui comportamento benigno:

- (A) Melanoma
- (B) Linfoma
- (C) carcinoma
- (D) Leiomioma**
- (E) Plasmocitoma

19. O que ocorrerá com a imagem de um elemento dentário se diminuirmos a angulação vertical durante a realização da tomada radiográfica periapical?

- (A) A imagem aumentará**
- (B) A imagem ficará tremida
- (C) A imagem diminuirá
- (D) Haverá superposição das faces proximais
- (E) A imagem ficará distorcida.

20. Um cirurgião dentista ao analisar uma radiografia periapical da região de incisivos superiores, observou uma imagem radiolúcida próximo ao ápice do dente 21. Qual a estrutura que primeiramente devemos analisar para uma possível hipótese de diagnóstico?

- (A) Espinha nasal anterior
- (B) Lâmina dura**
- (C) Sutura intermaxilar
- (D) Trabéculas ósseas
- (E) Septo nasal

21. Dentre as indicações da técnica radiográfica oclusal, encontram-se:

- (A) Verificar a presença de doenças periodontais.
- (B) Fraturas de arco zigomático.
- (C) Presença de cálculos salivares e dentes inclusos.**
- (D) Presença de espessamentos nos ligamentos periodontais.
- (E) Verificar a profundidade dos processos cariosos em dentes posteriores.

22. O procedimento pelo qual obtemos uma radiografia, após ter sido sensibilizada pelos raios X denomina-se?

- (A) Colimação
- (B) Filtração
- (C) Foco
- (D) Localização
- (E) Processamento**

23. Qual a finalidade da lâmina de chumbo colocada no interior da embalagem dos filmes intra-orais?

- (A) Proteger a película das radiações de alto poder de penetração
- (B) Proteger o filme do calor
- (C) Proteger o filme das radiações secundárias**
- (D) Aumentar o peso das películas para que não se desloquem
- (E) Proteger as películas da luz

24. Que estrutura anatômica da mandíbula se projeta numa incidência periapical de molares superiores?

- (A) Processo zigomático
- (B) Seio maxilar
- (C) Hámulo
- (D) Processo coronóide**
- (E) Tuberosidade

25. Com relação aos componentes de uma prótese parcial fixa, correlacione corretamente as colunas:

- (a) Dentes naturais ou raízes que suportam a PPF.
- (b) Componentes da PPF que assentam sobre o dente ou raiz preparados
- (c) Componentes da PPF que substituem os dentes naturais ausentes
- (d) Componentes da PPF que unem seus elementos
- ( ) Conectores
- ( ) Pônticos
- ( ) Pilares
- ( ) Retentores

Qual a sequência correta?

- (A) b-a-c-d
- (B) d-c-b-a
- (C) d-a-c-b
- (D) c-d-b-a
- (E) d-c-a-b

26. A rápida perda de inserção de tecido conjuntivo e osso alveolar somente em incisivos e primeiros molares de um paciente jovem, saudável e com higiene oral adequada caracteriza:

- (A) Periodontite crônica localizada
- (B) Gengivite crônica
- (C) Periodontite agressiva localizada
- (D) Periodontite agressiva generalizada
- (E) Gengivite necrosante aguda

27. Em preparos para restauração de cavidades classe III, uma abordagem por vestibular só poderá ser executada quando:

- (A) a cárie estiver somente na superfície lingual/palatal.
- (B) for necessária a substituição de restaurações que originalmente tenham sido executadas através de acesso vestibular.
- (C) o dente encontrar-se corretamente posicionado no arco dentário e o acesso lingual/palatal não implicar demasiado sacrifício de estrutura dental sadia.
- (D) a forma de contorno para o acesso palatal não envolver uma área de contato com o dente antagonístico.
- (E) for necessário um acabamento melhor que o esmalte dentário

28. Em relação à forma de resistência das cavidades feitas para procedimentos restauradores, é correto afirmar que:

- (A) é a formulação que a cavidade deve apresentar para que suas paredes resistam a esforços mastigatórios e às alterações de volume dos materiais restauradores, criadas por mudanças térmicas.
- (B) é a característica a ser dada à cavidade para evitar o deslocamento, sob a ação de esforços mastigatórios, dos materiais restauradores.
- (C) característica que deve ser dada ao preparo cavitário a fim de que sejam facilitados o acesso e a conformação da cavidade.
- (D) formulação dada à cavidade para se definir a superfície do dente a ser incluída no preparo cavitário.
- (E) é a forma dada a cavidade para reter o material restaurador.

29. O fórceps indicado para exodontia de molares inferiores é o de número:

- (A) 151
- (B) 150
- (C) 18 L
- (D) 17
- (E) 65

30. Como seria classificado, segundo Kennedy, um paciente que tenha perdido os elementos 11, 12, 21, 22, 25 e 26? (Todos os demais elementos estão presentes) .

- (A) Classe IV
- (B) Classe II modificação 1
- (C) Classe II modificação 2
- (D) Classe III modificação 1
- (E) Classe III modificação 2

31. Gabarito: letra eA perfuração na área de furca é ,com mais frequência, o resultado:

- (A) De preparos excessivos no acesso radicular
- (B) Do uso de limas hedstroem
- (C) De uma ocorrência natural
- (D) Do uso de lima tipo K
- (E) Da existência de uma bolsa periodontal

32. Os fatores que estão mais relacionados com a gengivite necrosante aguda (GNA) são:

- (A) fumo, stress emocional, alcoolismo
- (B) higiene oral deficiente, alcoolismo, stress emocional
- (C) higiene oral deficiente, fumo, stress emocional
- (D) higiene oral deficiente, fumo, alcoolismo
- (E) fumo, alcoolismo, imunodeficiência

33. A sequência correta para fechamento de uma ferida transfixante é:

- (A) plano interno, mucosa, pele
- (B) mucosa, plano interno, pele
- (C) plano interno, pele, mucosa
- (D) pele, plano interno, mucosa
- (E) pele, mucosa, plano interno

34. Com relação à polimerização das resinas compostas é INCORRETO afirmar:

- (A) O grau de conversão de polimerização de uma resina composta diminui progressivamente em relação à sua profundidade ou espessura.
- (B) O aumento do tempo de exposição da resina à luz aumenta a profundidade de polimerização efetiva.
- (C) Tonalidades mais escuras de material são polimerizadas até profundidades maiores.
- (D) A polimerização da resina continua a ocorrer numa taxa significativa por 20 minutos após a ativação.
- (E) A distância da ponta do fotopolimerizador à resina acarreta diferenças na profundidade de polimerização.

35. A imagem com uma lima hedstroem resulta:

- (A) No corte efetivo com a penetração
- (B) No corte efetivo com a tração
- (C) Em uma ausência de percepção tátil
- (D) No aprofundamento do conduto em sentido apical
- (E) Nenhuma das respostas

36. Constituem indicações para uma cirurgia periodontal, EXCETO

- (A) reduzir o acesso para o alisamento radicular
- (B) facilitar o controle da placa bacteriana
- (C) ampliar o acesso para a raspagem radicular
- (D) facilitar a terapia restauradora apropriada
- (E) reduzir a profundidade da bolsa

37. Após o preparo de uma prótese parcial fixa e colocação da ponte provisória o paciente foi dispensado. Na consulta seguinte será realizada a moldagem. Qual a sequência ideal de procedimentos para essa moldagem?

- (A) moldagem densa – remoção do provisório – limpeza dos preparos – afastamento gengival (7 min) – moldagem leve – remoção do fio – recolocação do provisório
- (B) remoção do provisório – limpeza dos preparos - moldagem leve – afastamento gengival (5min) – remoção do fio – moldagem pesada – recolocação dos provisórios
- (C) remoção do provisório – limpeza dos preparos – moldagem densa – afastamento gengival (5 a 7 min) – remoção do fio – moldagem leve – recolocação do provisório
- (D) remoção do provisório – limpeza dos preparos – afastamento gengival (5 a 7 min) – moldagem leve – remoção do fio – moldagem pesada – recolocação do provisório
- (E) afastamento gengival (5 a 7 min) – moldagem densa – remoção do provisório – limpeza do preparo – remoção do fio – moldagem leve – recolocação do provisório

38. Quanto à Disfunção Temporomandibular é correto afirmar que:

- (A) é de etiologia multifatorial, pode ou não apresentar queixa dolorosa de natureza espontânea e sempre é acompanhada de limitação funcional dos movimentos mandibulares
- (B) é de etiologia desconhecida, pode ou não apresentar queixa dolorosa de natureza espontânea e nem sempre é acompanhada de limitação funcional dos movimentos mandibulares
- (C) é de etiologia multifatorial, apresenta queixa dolorosa espontânea e evocada, condição evolui com perda de capacidade funcional em relação aos movimentos mandibulares
- (D) é de etiologia multifatorial, envolve a presença de ruídos articulares e perda de capacidade funcional em relação aos movimentos mandibulares
- (E) é de etiologia multifatorial, pode ou não estar associada a queixa dolorosa, ruídos articulares e/ou perda de capacidade funcional em relação aos movimentos mandibulares

39. A odontopediatra Walquíria indicou profilaxia com flúor em seu pequeno paciente Gilmar, porém como ele já usava dentifrícios com alto teor de flúor (o que era de desconhecimento da profissional), acabou por apresentar fluorose (lesões irreversíveis de coloração amarelo acastanhada devido à excessiva deposição de flúor). Tal fenômeno é considerado no estudo da distribuição como:

- (A) aprisionamento
- (B) armazenamento
- (C) reservatório
- (D) redistribuição
- (E) transporte

40. Paciente do sexo masculino, com 3 anos de idade, necessita submeter-se a extração do dente 51 devido a um traumatismo dento-alveolar que resultou em grande fratura transversal. A criança é portadora de cardiopatia congênita cianótica e não é alérgica a medicamentos. O cirurgião-dentista deve:

(A) evitar o uso de antibióticos, pois a profilaxia é desnecessária na exodontia de decíduos.

(B) prescrever amoxicilina – 50 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.

(C) prescrever tetraciclina – 50 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.

(D) prescrever cloranfenicol – 50 mg/Kg de peso corporal, via oral, 1 hora antes do procedimento.

(E) reduzir a bacteremia, usando bochechos com clorexidina a 0,12%, 3 a 5 minutos antes do procedimento.

41. Sobre a localização dos espaços primatas nos arcos decíduos é correto afirmar que eles situam-se entre:

(A) os incisivos laterais e os caninos no arco

(B) superior os incisivos centrais em ambos os arcos

(C) os caninos e os primeiros molares no arco superior

(D) os incisivos laterais e os caninos no arco inferior

(E) os incisivos centrais e os incisivos laterais em ambos os arcos

42. A fratura coronária complicada é uma fratura que envolve:

(A) esmalte e dentina, sem exposição da pulpar

(B) esmalte e dentina, com exposição pulpar

(C) esmalte, dentina e cimento, sem exposição pulpar

(D) esmalte, dentina e cimento, com exposição pulpar

(E) esmalte

43. Em crianças, a complicação mais comum após anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior é:

(A) fratura de agulha

(B) hematoma

(C) parestesia

(D) lipotímia

(E) mordida do lábio

44. Os dentifrícios constituem-se no veículo de flúor mais utilizado mundialmente, apresentando-se no mercado nas mais diversas concentrações. A principal indicação dos cremes dentais com teores de flúor menores que 600ppm (parte por milhão) é feita para:

(A) crianças pequenas, diminuindo o risco de fluorose por deglutição do produto

(B) idosos, pois não necessitam dos benefícios do flúor para redução da cárie

(C) crianças que apresentam fluorose, visando o não agravamento dos sintomas

(D) pacientes alérgicos ao flúor, evitando a intoxicação aguda

(E) adolescentes com alto índice de atividade de cárie

45. Durante o processo de adequação de várias cavidades abertas em uma criança de seis anos de idade, ocorreu a exposição pulpar do elemento 85. A opção de procedimento terapêutico mais adequado para o caso em questão é:

- (A) capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio
- (B) capeamento pulpar indireto com IRM
- (C) pulpotomia
- (D) pulpectomia
- (E) exodontia

46. Levando-se em consideração uma cidade com temperatura média ambiente de 27°C, o teor adequado de flúor, em partes por milhão (ppm), na água que abastece essa localidade, para obter-se o benefício da prevenção da cárie dental sem, no entanto, induzir a fluorose em seus consumidores, é igual a:

- (A) 0,6 ppm
- (B) 0,7 ppm
- (C) 0,8 ppm
- (D) 0,9 ppm
- (E) 1,0 ppm

47. É correto afirmar que, segundo Proffit, a seqüência de erupção de dentes permanentes que mais se aproxima da seqüência ideal é:

- (A) 31/41 – 36/46 – 11/21 – 32/42 – 33/43 – 13/23
- (B) 31/41 – 36/46 – 11/21 – 13/23 – 32/42 – 33/43
- (C) 31/41 – 16/26 – 11/21 – 32/42 – 13/23 – 33/43
- (D) 36/46 – 31/41 – 11/21 – 13/23 – 32/42 – 33/43
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

48. Paciente, com 14 anos, do sexo masculino, apresenta as seguintes características: distoclusão; vestibuloversão de 12 e 22 e supravversão de 11 e 21. Considerando-se esse quadro, é correto afirmar que, segundo Angle, o tipo de má oclusão apresentada por esse paciente é:

- (A) Classe I
- (B) Classe II, divisão 1
- (C) Classe II, divisão 2
- (D) Classe III
- (E) Classe III, subdivisão direita

49. O espaço livre de Nance (Lee Way Space) é de, em média, no arco inferior e superior, respectivamente:

- (A) 1,7mm e 0,9mm
- (B) 0,9mm e 1,7mm
- (C) 1,8mm e 3,4mm
- (D) 3,4mm e 1,8mm
- (E) 1,8mm e 0,9mm

50. É considerado sinal normal da dentição decídua:

- (A) Sobre mordida profunda
- (B) Plano terminal com degrau distal
- (C) Inclinação acentuada dos dentes anteriores
- (D) Arco de forma triangular
- (E) Canino inferior articulando à frente do superior

51. O deslocamento da maxila tem direção para:

- (A) Posterior e inferior
- (B) Posterior e superior
- (C) Anterior e posterior
- (D) Anterior e inferior
- (E) Anterior e superior

52. O primeiro levante fisiológico da oclusão ocorre quando irrompem os:

- (A) Incisivos decíduos
- (B) Segundos molares decíduos
- (C) Primeiros molares permanentes
- (D) Primeiros molares decíduos
- (E) Caninos decíduos

53. Os estudos sobre Psicossomática são de grande contribuição para o entendimento do ser humano, objeto de estudo e intervenção dos diversos profissionais que compõem a vasta área da saúde. Este paradigma se aplica a área da Odontologia porque traz contribuições em relação:

- (A) A erupção dentária.
- (B) Aos aspectos psicológicos do sujeito.
- (C) Ao tratamento das doenças bucais
- (D) Aos tecidos dentários.
- (E) À compreensão da interação entre os aspectos psíquicos e somáticos na produção das patologias bucais.

54. A fase do desenvolvimento infantil, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, em que ocorre a eclosão do primeiro dente, é a:

- (A) Fase fálica
- (B) Fase oral
- (C) Fase de latência
- (D) Fase anal
- (E) Fase da infância

55. A ansiedade é um sentimento bastante comum na prática odontológica. Escolha a alternativa que melhor expressa sua sintomatologia:

- (A) Sudorese e pupilas dilatadas.
- (B) Taquicardia e dor de cabeça.
- (C) Inflamação na gengiva e tremores.
- (D) Sudorese e flatulência.
- (E) Taquicardia e alergia.

56. Em muitos casos o cirurgião-dentista é o primeiro profissional de saúde a identificar casos de crianças e adolescentes vitimizados em seus lares. Marque a alternativa que cita três modalidades de violência doméstica infantil.

- (A) Violência psicológica, negligência, atropelamento.
- (B) Inflamação, violência física, negligência.
- (C) Negligência, violência física, violência física fatal.
- (D) Abandono, tráfico de drogas, violência psicológica.
- (E) Infecção, atropelamento, facada.

57. A notificação dos casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes por parte dos profissionais de saúde e de educação está prevista em Lei, prevendo inclusive punições para os profissionais que não o fizerem. Marque a alternativa que cita a Legislação a qual a questão se refere:

- (A) Código Penal
- (B) Código Civil
- (C) Código de menores
- (D) Estatuto da Criança e do Adolescente
- (E) Código de menores de 1988

58. João, 40 anos, mora sozinho em um apartamento alugado por sua família, é fumante, gosta de livros e de conversar com pessoas quando vai até a padaria tomara café. Nessas ocasiões diz que é filósofo, cientista, amigo de Einstein. Tem uma lista de nomes de presidentes do Brasil e de outros países de mundo que, segundo ele, o consultaram. Foi o inventor da TV a cores e com isso ficou muito rico, apesar de aparentar o contrário. Atualmente, está prestes a descobrir a cura de uma doença que mata muita gente sem explicação. Por isso, muitos espíões estão atrás dele e ele deve tomar muito cuidado. Fala que o sucesso é muito bom, mas desperta muita inveja das pessoas e que para se defender disso, anda disfarçado.

A situação clínica acima aponta para um transtorno mental. Identifique-o:

- (A) Neurose de transferência
- (B) Bulimia
- (C) Anorexia
- (D) Esquizofrenia**
- (E) TOC

59. As principais características que podem ser observadas pelos profissionais de saúde em relação ao paciente psicótico, são:

- (A) Ansiedade e depressão.
- (B) Delírios e medos.
- (C) Delírios e alucinações.**
- (D) . Ansiedade e medo
- (E) Medo e alucinações.

60. Uma característica imprescindível do profissional de odontologia em relação ao acolhimento de seu paciente, é:

- (A) Realizar o exame clínico.
- (B) Escutar seu paciente.**
- (C) Preencher o prontuário odontológico no primeiro encontro.
- (D) Falar sobre o procedimento que será realizado.
- (E) Realizar exame intra-bucal.

61. Analise as correlações dos níveis de atenção à saúde:

- I. Imunização - atenção primária
- II. Diagnóstico precoce da Hipertensão - atenção primária
- III. Acompanhamento do pré-natal - atenção secundária
- IV. Transplante renal - atenção terciária

São CORRETAS as correlações:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e III apenas
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.**

62. "Mudança na lógica do atendimento realizado por profissional de saúde que, utilizando protocolos técnicos, avalia o critério de priorização do atendimento, conforme o agravo à saúde e não a ordem burocrática de chegada." (HumanizaSUS).

O conceito refere-se a:

- (A) Classificação de risco.**
- (B) Urgência / emergência.
- (C) Acolhimento.
- (D) Assistência especializada.
- (E) Limitação do dano.

63. Analise as afirmativas abaixo baseadas na Constituição Federal de 1988, Título II, Capítulo II, Seção II, que trata da saúde:

I. A assistência à saúde é de livre concorrência, não havendo restrições

à participação direta ou indireta de empresa com fim lucrativo ou capital estrangeiro.

II. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções

às instituições com fins lucrativos.

III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

IV. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde.

São CORRETAS as afirmativas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e IV, somente.
- (C) I, III e IV, somente.
- (D) II, III e IV, somente.
- (E) I, II e III, somente

64. A Política Nacional de Saúde Bucal apresenta o conceito de "linhas de cuidado". Observe as alternativas :

1 - As linhas do cuidado s e dividem em linhas da criança, do adulto e do idoso.

2 – As linhas do cuidado implicam em um redirecionamento do processo de trabalho.

3 – As linhas do cuidado apontam, fundamentalmente, para a oferta de serviços nos níveis secundário e terciário.

Marque a resposta CORRETA:

- (A) Apenas a afirmativa 1 está correta;
- (B) Apenas a afirmativa 2 está correta;**
- (C) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas;
- (D) Apenas a afirmativa 3 está correta;
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

65. A Política Nacional de Saúde Bucal apresenta alguns princípios norteadores das ações. O princípio que responsabiliza a unidade ou serviço de saúde na solução dos problemas em sua área de abrangência, através da oferta de ações qualificadas, eficazes e que permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua execução é o:

- (A) Controle Social;
- (B) Acesso;
- (C) Acolhimento;
- (D) Inclusão;
- (E) Vínculo**

66. No processo de planejamento em saúde é necessário definir alguns termos. O conceito que indica orientação para ação, uma proposição de otimização dos trabalhos de outros, que não o do planejador é:

- (A) plano;**
- (B) avaliação;
- (C) implementação;
- (D) planejamento estratégico.
- (E) mecanização

67. Com relação às enzimas podemos afirmar que:

- (A) não sofrem alterações em sua atividade catalítica com mudanças no pH, temperatura, pressão e concentração de substrato.
- (B) podem agir tanto pelo modelo de encaixe induzido, de chave-fechadura, quanto por regulação alostérica.
- (C) podem sofrer a ação de inibidores competitivos, que diminuem a velocidade da reação e alteram o valor de Km, sem alterar a afinidade da enzima pelo substrato desta reação.
- (D) por serem extremamente específicas, apresentam apenas um substrato, um sítio de ligação e nenhum sítio alostérico.
- (E) nenhuma das respostas anteriores.

68. O músculo estriado esquelético é formado por:

- (A) células cilíndricas, alongadas, núcleos periféricos
- (B) aglomerados de células fusiformes
- (C) células alongadas, ramificadas, unidas por discos intercalares
- (D) células cilíndricas, ramificadas, fusiformes
- (E) células poliédricas, justapostas, pouca substância extracelular

69. Podemos dizer que a doença cárie é de caráter multifatorial onde hábitos do paciente seriam responsáveis por uma mudança no microambiente oral, favorecendo o crescimento de microrganismos cariogênicos. Quais as propriedades mais importantes que favoreceria estes microrganismos a desenvolver o processo carioso?

- (A) Capacidade de resistir a baixos teores de oxigênio, pois são anaeróbios estritos.
- (B) Capacidade de produzir enzimas proteolíticas.
- (C) Capacidade formar o biofilme.
- (D) Capacidade de produzir ácido acético a partir de açúcares.
- (E) Capacidade de produzir enzimas que dissociem o esmalte dentário

70. Gabarito: letra c. Os órgãos de primeira passagem no que diz respeito à distribuição de fármacos uma vez presentes na circulação sanguínea, são:

- (A) SNC, coração, fígado, tecido adiposo
- (B) SNC, estômago, pulmões, baço e fígado
- (C) SNC, pele, musculatura lisa, ossos e fígado
- (D) SNC, tecido adiposo e rins
- (E) SNC, coração, pulmões, fígado e rins

71. A carótida externa tem como um dos ramos terminais a

- (A) Artéria facial
- (B) Artéria faríngea ascendente
- (C) Artéria occipital
- (D) Artéria temporal superficial
- (E) Artéria tireóidea superior

72. Em um abscesso, a infecção purulenta se encontra:

- (A) Difusa e sem formação de pus
- (B) Nos limites do osso
- (C) No interior da câmara pulpar
- (D) Nos canalículos dentinários
- (E) Localizada e circunscrita

73. Qual a célula do tecido conjuntivo que apresenta as seguintes características: ovóide, núcleo excêntrico, cromatina em grumos compactos e grosseiros (lembrando raios de carroça), produz imunoglobulinas?

- (A) macrófago
- (B) mastócito
- (C) plasmócito
- (D) fibroblasto
- (E) pericito

74. A reabsorção óssea leva à exposição da porção radicular do elemento dentário, o que facilita a ação de microrganismos cariogênicos, levando a cáries radiculares. Quais os principais microrganismos responsáveis pela cárie radicular?

- (A) Bactérias do gênero Lactobacillus.
- (B) Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguis e Streptococcus oralis.
- (C) Prevotella intermédia e Aggregatibacter actinomycetemcomitans.
- (D) Streptococcus do grupo mutans.
- (E) Bactérias do gênero Actinomyces.

75. Com relação às associações farmacológicas, é CORRETO afirmar que:

- (A) adição é o aumento da dose de um dado fármaco
- (B) sinergismo ocorre quando um dado fármaco não apresenta atividade para determinada ação e, quando associado a outro, promove aumento da capacidade de produzir efeito deste último
- (C) potencialização ocorre quando o fármaco apresenta efeito mais prolongado
- (D) antagonismo é quando o fármaco tem sua própria ação bloqueada
- (E) adição refere-se ao volume da dose

76. O nervo lingual do V par craniano sofre anastomose com o ramo de outro par craniano. Qual seria este?

- (A) VII
- (B) IV
- (C) VIII
- (D) IX
- (E) X

77. Sarcoma é uma denominação usada para os tumores de origem:

- (A) Epitelial
- (B) Medular
- (C) Mesenquimatosa
- (D) Linfóide
- (E) Glandular

78. Qual dos tecidos abaixo compreende o periodonto de proteção?

- (A) Cimento radicular
- (B) Ligamento periodontal
- (C) Esmalte
- (D) Gengiva
- (E) Osso alveolar

79. De acordo com os seus conhecimentos sobre o meio bucal, marque (V) ou (F) para afirmativas verdadeiras ou falsas, respectivamente:

- ( ) vários são os tampões salivares que têm como função controlar o pH do meio bucal para evitar lesões causadas por substâncias com pHs extremos.
- ( ) a digestão da celulose dos alimentos começa no meio bucal por ação da amilase salivar, constituindo uma das funções da saliva.
- ( ) lubrificação, aglutinação do alimento, tamponamento, autolimpeza e digestão inicial de polissacarídeos constituem funções da saliva.
- ( ) a amilase salivar, assim como qualquer outra enzima, não tem restrições de valor de pH para que sua atividade catalítica se mantenha.

Assinale a sequência correta:

- (A) V-F-V-V
- (B) V-F-F-V
- (C) F-V-F-V
- (D) V-F-V-F**
- (E) F-F-V-F

---

80. A alteração endócrina que causa prognatismo nos pacientes afetados é o:

- (A) Hiperpituitarismo**
- (B) Hipopituitarismo
- (C) Hipertireoidismo
- (D) Hipotireoidismo
- (E) Hipoparatiroidismo